

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقمها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (٢٠/٤٥٥٢٩٤٠٠) وتاريخ (١٤٤٧/١/٢٧هـ)، والمشار فيه إلى خطاب هيئة الصحة العامة "وقاية" رقم (١٠١-٤٧-٠٠٧٧٨١) وتاريخ (٢٠ محرم ١٤٤٧هـ)، والمشار فيه إلى قيام الهيئة بدراسة التدخلات الوقائية للأمراض المعدية التالية المكورات النيسيرية السحائية وفيروس المخلوي التنفسي وفيروس الانفلونزا، وتوصي بما يلي:

أولاً/ التوصيات المتعلقة بلقاح المكورات السحائية من المجموعة المصلية ب (MenB):

توصي الهيئة بإعطاء لقاح المكورات النيسيرية السحائية من المجموعة المصلية ب (MenB) لفئات محددة

معرضة لخطر الإصابة بسبب حالتهم الصحية أو بسبب تزايد خطر تعرضهم للميكروب والتي تشمل الاتي:

- المرضى الذين يعانون من ضعف وظيفي في الطحال (مثل مرضى الأنيميا المنجلية)، أو الذين أجرى لهم استئصال الطحال.
- العاملين الصحيين في المختبرات الذين يتعاملون مع عزل المكورات السحائية النيسيرية.
- الأطفال بعد التعافي من مرض التهاب السحايا النيسيرية وذلك بعد تقييمهم من قبل الطبيب المعالج.
- المرضى الذين يعانون من نقص أو غياب مكونات الجهاز المكمل (Complement Deficiency) مثل (Complement inhibitors) المرضى الذين يخضعون لعلاجات مثبطة لمكونات الجهاز المكمل إيكوليزوماب (eculizumab) أورافوليزوماب (Ravulizumab).
- الأشخاص المعرضين للإصابة أثناء حدوث تفشي للمكورات السحائية النيسيرية المجموعة المصلية ب.
- الأطفال بعد تلقيهم ثلاث جرعات من اللقاح للفئات الموضحة أعلاه، الجرعة الثانية بعد شهرين من الجرعة الأولى والجرعة الثالثة بعد ستة أشهر، مع إمكانية إعطاء جرعات تنشيطية بحسب تقييم الطبيب المعالج لكل حالة.
- اسم اللقاح (CMenB 4) للفئة العمرية شهرين فأكثر، (MenB-FHBP) للفئة العمرية عشرة سنوات فأكثر.
- ثانياً/ فيما يخص التوصيات المتعلقة بلقاحات الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) للبالغين الأكبر سناً: توصي الهيئة بتطعيم الأشخاص في الفئة العمرية ٦٠ عام وأكبر ولديهم إحدى عوامل الخطورة الموضحة أدناه بلقاح الفيروس التنفسي المخلوي بجرعة واحدة إذا لم يتلقوا اللقاح من قبل وذلك للفئات التالية:

- أمراض القلب المزمنة (مثل فشل القلب).
- أمراض الكبد المزمنة (مثل تلف الكبد).
- حالات ضعف المناعة المتوسطة إلى الشديدة.
- جميع البالغين بعمر ٧٥ سنة وأكبر.
- أمراض الكلى المزمنة.
- سكان مرافق الرعاية طويلة الأجل.
- أمراض الدم المزمنة (مثل الأنيميا المنجلية والثلاسيميا).
- الأمراض العصبية المزمنة أو الاضطرابات العصبية العضلية التي تؤثر على مجرى التنفس أو عضلات الجهاز التنفسي.
- أمراض الرئة أو جهاز التنفسي المزمنة (مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو).
- مرض السكري.
- السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم ك ٤٠ كجم/م٢).

لمزيد من المعلومات وللإطلاع على باقي التفاصيل يمكنكم زيارة موقع الغرفة الإلكتروني: (www.chamber.org.sa).



الموضوع : بشأن التدخلات الوقائية للأمراض المعدية

الأمانة العامة المساعدة للجان الوطنية

سلمه الله

سعادة أمين عام الغرفة التجارية بالشرقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إشارة إلى خطاب هيئة الصحة العامة "وقاية" رقم ٠٠٧٧٨١-٤٧-١٠١ وتاريخ ٢٠ محرم ١٤٤٧ هـ ، والمشارفيه الى قيام الهيئة بدراسته التدخلات الوقائية للأمراض المعدية التالية المكورات النيسيرية السحائية وفيروس المخلوي التنفسي وفيروس الانفلونزا ، وتوصي بما يلي :

اولاً / التوصيات المتعلقة بلقاح المكورات السحائية من المجموعة المصلية ب (MenB) :
توصي الهيئة بإعطاء لقاح المكورات النيسيرية السائحة من المجموعة المصلية ب (MenB) لفئات محددة معرضة لخطر الإصابة بسبب حالتهم الصحية أو بسبب تزايد خطر تعرضهم للميكروب والتي تشمل الآتي :

• المرضى الذين يعانون من ضعف وظيفي في الطحال (مثل مرضى الأنيميا المنجلية) ، أو الذين أجرى لهم استئصال الطحال.

• المرضى الذين يعانون من نقص أو غياب مكونات الجهاز المكمل (Complement Deficiency)
• المرضى الذين يخضعون لعلاجات مثبطة لمكونات الجهاز المكمل (Complement inhibitors) مثل إيكوليزوماب (eculizumab) أو رافوليزوماب (Ravulizumab)

• الأطفال بعد التعافي من مرض التهاب السحايا النيسيرية وذلك بعد تقييمهم من قبل الطبيب المعالج.

• العاملين الصحيين في المختبرات الذين يتعاملون مع عزل المكورات السحائية النيسيرية.

• الأشخاص المعرضين للإصابة أثناء حدوث تفشي للمكورات السحائية النيسيرية المجموعة المصلية ب .

كما توصي بإعطائهم ثلاث جرعات من اللقاح للفئات الموضحة أعلاه ، الجرعة الثانية بعد شهرين من الجرعة الأولى والجرعة الثالثة بعد ستة أشهر ، مع إمكانية إعطاء جرعات تنشيطية بحسب تقييم الطبيب المعالج لكل حالة.

اسم اللقاح : (4CMenB) للفئة العمرية شهرين فأكثر ، (MenB-FHBP) للفئة العمرية عشرة سنوات فأكثر.

ثانياً / فيما يخص التوصيات المتعلقة بلقاحات الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) للبالغين الأكبر سناً :

توصي الهيئة بتطعيم الأشخاص في الفئة العمرية 60 عام وأكبر ولديهم إحدى عوامل الخطورة الموضحة أدناه بلقاح الفيروس التنفسي المخلوي بجرعة واحدة إذا لم يتلقوا اللقاح من قبل وذلك للفئات التالية :

• أمراض القلب المزمنة (مثل فشل القلب) .

• أمراض الكلى المزمنة .

• مرض السكري.

ص 1 من 2



- أمراض الكبد المزمنة (مثل تلف الكبد) .
- سكان مرافق الرعاية طويلة الأجل.
- أمراض الرئة أو جهاز التنفسي المزمنة (مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو) .
- حالات ضعف المناعة المتوسطة إلى الشديدة .
- أمراض الدم المزمنة (مثل الأنيميا المنجلية والثلاسيميا) .
- السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم ك 40 كجم/م²) .
- جميع البالغين بعمر 75 سنة وأكبر .
- الأمراض العصبية المزمنة أو الاضطرابات العصبية العضلية التي تأثر على مجرى التنفس أو عضلات الجهاز التنفسي .

كما توصي بتطعيم الأشخاص في الفئة العمرية 50 إلى 59 سنة ولم يتلقوا اللقاح من قبل ولديهم إحدى عوامل الخطورة المشار إليها أعلاه بناءً على التقييم وتوصية الطبيب المعالج .

ثالثاً / التوصيات المتعلقة بلقاح الإنفلونزا الثلاثي ومقارنته بلقاح الإنفلونزا الرباعي؛

توصي الهيئة بأفضلية استخدام لقاح الإنفلونزا الثلاثي بدل من لقاح الإنفلونزا الرباعي ، وذلك نظراً لعدم رصد سلالة Yamgata عالمياً أو محلياً ولعدم ارتباطها بتفشيات مؤكدة لفيروس الإنفلونزا، وكما توصي بأفضلية استخدام لقاح الإنفلونزا الثلاثي عالي الجرعات للأشخاص في الفئة العمرية 65 سنة وأكبر بدل من لقاح الإنفلونزا عالي الجرعات الرباعي، مع أهمية استمرار تقييمها سنوياً نظراً للطبيعة المتغيرة لسلالات الإنفلونزا واستناداً إلى مستجدات بيانات الترصد الوبائي المحلي والعالمي.

عليه ، أمل من سعادتكم التكرم بعد الاطلاع توجيه من يلزم بالتعميم على المنشآت الصحية من مشتركين منظومتكم الموقرة، وحثهم على الالتزام بالتوصيات المذكورة أعلاه .

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري

الأمين العام

وليد بن حمد العرينان